

Γενικό πρόγραμμα εφαρμογής σε επιτραπέζια σταφύλια, με προϊόντα AgriLife



Μήνες	Ιαν 1. 2. 3.	Φεβ 1. 2. 3.	Μαρ 1. 2. 3.	Απρ 1. 2. 3.	Μάι 1. 2. 3.	Ιού 1. 2. 3.	Ιουλ 1. 2. 3.	Αυγ 1. 2. 3.	Σεπ 1. 2. 3.	Οκτ 1. 2. 3.	Νοε 1. 2. 3.	Δεκ 1. 2. 3.
Στάδιο ανάπτυξης												
Λήθαργος	***	***	***	*								
Φούσκωμα οφθαλμών				***								
Έκπτυξη φύλλων					***							
Άνθιση						***						
Καρπόδεση						*	***	*				
Αλλαγή χρώματος								***	*			
Έναρξη ωρίμανσης									**	**		
Γήρανση φύλλων											***	
Προτεινόμενες εφαρμογές												
Αριθμός εφαρμογών				1.	2,3,	4,5.	6,7,8.	9,10,11.				
Οι σημαντικότερες ασθένειες												
Ωίδιο				*	***	***	***	*				
Περονόσπορος			***	***		*	***	**				
Βοτρύτης στα τσαμπιά					*		**	***	*			
Black rot			**		***		*	**				
Phomopsis macrophoma			**		***							
Οι σημαντικότεροι εχθροί												
Ευδεμήδα			**	**	***	*	***	*				
Ακάρεα			**	**	***			***				
Ψευδόκοκκος						**		**	*			
Nemato-des								**	*			

Γενικό πρόγραμμα εφαρμογής σε επιτραπέζια σταφύλια, με προϊόντα AgriLife



1

Στάδιο D Έκπτυξη



Στάδιο E : Δεύτερο φύλλο ξεδιπλωτό και απομάκρυνση από την κληματίδα

2

1^{ος} εμβολιασμός.



Στάδιο F : 4-5 ξεδιπλωμένα φύλλα και εμφάνιση σταφυλιών.

3



Στάδιο G διαμορφωμένες ταξιανθίες.

Στάδιο D,E
Somguard
0,3-0,5 %
Bindou 0,01%
μετά
5-6 ημέρες
να γίνει
εμβολιασμός.

Στάδιο E,F
Marathon 7
Symbio 1
Δόση 0,1%
Derma 0,2%
7-10 ημέρες.
AgriBoom 0.25%
Bindou 0,01%

Στάδιο F,G
Symbio 2
and **Azama**
Δόση 0,1%
0,25%
το καθένα.
Marathon 7
0,2% **Bindou** 0,01%.
Για έντομα ασθένειες.
AgriBoom 0.25%

2^{ος} εμβολιασμός.

Η προστασία πρέπει να αρχίζει
από τα βλαστικά στάδια D,E,F
ώστε να μειώνονται
σημαντικά
τα αρχικά μολύσματα.

Γενικό πρόγραμμα εφαρμογής σε επιτραπέζια σταφύλια, με προϊόντα AgriLife



4

3^{ος} εμβολιασμός.
Στάδιο Η
Άνθιση

ΣΤΟ 50% ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ
Symbio 2 0,2%
Marathon 7 0,2%
Derma 0,2%
Για έντομα ασθένειες
AgriBoom 0.25%
Bindou 0,01%

5

Στο 50% της σταδίου
αραίωμα του τσαμπιού

AgriBoom 0.3%
Lesino 0.1%
Bindou 0,01%

GA₃ 2-3 χάπια /
100 κιλά νερό



6

4^{ος} εμβολιασμός.
Στάδιο Ι
Καρπόδεση
Symbio 2
Symbio 1, Azama
0,2% το καθένα
Marathon 7 0,2%
Derma 250cc/100κιλά
Bindou 0,01%
Για έντομα ασθένειες
Από το έδαφος
Μετά το καθάρισμα
του τσαμπιού
Kohinoor
0,5κιλά/στρ

7

Μέγεθος
ρόγας
3-5mm
Για αύξηση
μεγέθους .
AgriBoom
0.3%
Lesino 0.15-
0.2%
Bindou 0,01%
GA₃ 3-4 χάπια /
100κιλα νερό

Γενικό πρόγραμμα εφαρμογής σε επιτραπέζια σταφύλια, με προϊόντα AgriLife



Πριν το κλείσιμο του
σταφυλιού

9

5^{ος} εμβολιασμός.

Symbio 1

and **Azama**

Δόση 0,1%

0,25%

το καθένα.

Marathon 7

Bindou

Δόση 0,01%

0,2% Για έντομα
ασθένειες.

AgriBoom 0.25%



Στο κλείσιμο του
σταφυλιού

10

6^{ος} εμβολιασμός.

Marathon 7

Symbio 2

Δόση 0,1%


Derma 0,2%

AgriBoom

0.25%

Bindou

Δόση 0,01%



Αλλαγή χρώματος

11

7^{ος} εμβολιασμός.

Symbio 1

and **Azama**

Δόση 0,1% 0,25%

το καθένα.

Bindou 0,01%

Marathon 7

0,2% κάθε

7-10 ημέρες.

Για έντομα ασθένειες.

AgriBoom 0.25%